2015–2023 年我国不同区域 PM_{2.5} 组分特征及变化趋势

梁建平¹, 徐洋¹, 张皓然¹, 李楠^{1,*}

1.南京信息工程大学环境科学与工程学院, 南京 210044

摘要 近年来我国 PM_{2.5} 浓度明显降低, 但不同的 PM_{2.5} 组分变化存在显著的时间和区域差异。目前基于数值模式和在线观测的 PM_{2.5} 组分变化研究多针对代表性站点和时段, 缺乏对长时间多区域的 PM_{2.5} 组分年际变化的研究。本研究基于自主研发的多元示踪模型 (MTEA) 结合空气质量监测网格数据, 建立 2015-2023 年我国 367 个城市一次 PM_{2.5} (PPM) 和二次 PM_{2.5} (SPM) 浓度数据集, 进一步分析不同区域 PPM、SPM 和二次颗粒物占比 SPM/PM_{2.5} (SPM%) 的空间分布和年际变化特征。结果表明: 2015-2023 年我国 PPM 浓度从 15.85 $\mu\text{g m}^{-3}$ 下降至 10.28 $\mu\text{g m}^{-3}$, SPM 浓度从 25.86 $\mu\text{g m}^{-3}$ 下降至 15.42 $\mu\text{g m}^{-3}$, 9 年间分别下降了 35.02% 和 40.37%。2015-2023 年 PPM 和 SPM 的年际变化趋势在 2021 年前后呈现出不同特征, 2015-2021 年间均以较快速度下降 ($-0.91 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 和 $-1.70 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), 而 2021 年后 PPM 下降速度变缓 ($-0.14 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), SPM 甚至出现轻微上升 ($+0.10 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$)。SPM% 整体变化情况与 SPM 相似, 2021 年前以 $-0.38\% \text{ yr}^{-1}$ 速度下降, 2021 年后以上升 ($+0.38\% \text{ yr}^{-1}$)。就不同区域而言, 我国华北和华中地区 PPM 和 SPM 浓度最高, 对应更强的人为污染排放; 但 SPM% 则是华南和西南地区更高 (66.67%~68.66%), 这与南方更强的大气氧化能力有关。大多数地区 PPM 和 SPM 浓度变化趋势与全国整体趋势一致, 除西南地区的在 2021 年后 SPM 和 SPM% 仍保持显著的下降趋势。本研究提供的不同区域颗粒物组分趋势分析可为我国未来颗粒物污染管控提供科学依据和数据支撑。

关键词 空气污染; PM_{2.5}; 气溶胶组分; 变化趋势

收稿日期 2025-6-5; 网络预出版日期

作者简介 梁建平, 女, 2000 年出生, 南京信息工程大学硕士研究生, 从事大气环境研究, E-mail: 3318632119@qq.com

通讯作者 李楠, 南京信息工程大学副教授, 硕士生导师, E-mail:

linan@nuist.edu.cn

资助项目 国家重点基础研究发展计划 2022YFC3701005

Funded by National Program on Key Basic Research Project (2022YFC3701005)

23 文章编号: 2025039C doi: 10.3878/j.issn.1006-9895.2505.25039

24 **Component characteristics and variation trend of PM_{2.5} in different regions of**
25 **China during 2015-2023**

26 LIANG Jianping¹, XU Yang¹, ZHANG Haoran¹, LI Nan^{1,*}

27 1. School of Environmental Science and Engineering, Nanjing University of
28 Information Science & Technology, Jiangsu, Nanjing 210044

29 **Abstract:** In recent years, the concentration of PM_{2.5} in China has significantly
30 decreased, but there are notable temporal and regional differences in the changes of
31 different PM_{2.5} components. Current research on PM_{2.5} component changes, based on
32 numerical models and online observations, mostly focuses on single site and
33 representative periods, lacking high spatiotemporal resolution studies on regional and
34 interannual variations of PM_{2.5} components. This study, based on a multivariate tracer
35 model (MTEA) combined with grid data from air quality monitoring, establishes a
36 dataset of primary PM_{2.5} (PPM) and secondary PM_{2.5} (SPM) concentrations for 367
37 cities in China from 2015 to 2023. The results show that from 2015 to 2023, the
38 concentrations of PPM and SPM in China decreased from 15.85 $\mu\text{g m}^{-3}$ and 25.86 $\mu\text{g m}^{-3}$
39 m^{-3} to 10.28 $\mu\text{g m}^{-3}$ and 15.42 $\mu\text{g m}^{-3}$, respectively, with a reduction of 35.02% and
40 40.37% over nine years. The interannual trends of PPM and SPM from 2015 to 2023
41 showed different characteristics before and after 2021, with a rapid decline from 2015
42 to 2021 ($-0.91 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ and $-1.70 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), and a slowdown in the decline of
43 PPM after 2021 ($-0.14 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), while SPM even showed a slight increase ($+0.10$
44 $\mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$). The overall trend of SPM% was similar to that of SPM, decreasing at a
45 rate of $-0.38\% \text{ yr}^{-1}$ before 2021 and increasing at a rate of $+0.38\% \text{ yr}^{-1}$ after 2021. In
46 terms of different regions, the highest concentrations of PPM and SPM were found in
47 North and Central China, corresponding to stronger anthropogenic emissions; however,
48 the SPM% was higher in South and Southwest China (66.67%~68.66%), which is
49 related to the stronger atmospheric oxidation capacity in the south. The trends of PPM
50 and SPM concentrations in most regions were consistent with the national trend, except

51 for the Southwest region where SPM and SPM% continued to decline significantly after
52 2021. This study can offer scientific and data support for future particulate matter
53 pollution control in China.

54 **Keywords:** Air pollution; PM_{2.5}; Aerosol composition; Variation trends

55 1 引言

56 细颗粒物 (PM_{2.5}) 是近年来我国大气污染防治的主要控制目标。PM_{2.5} 包括
57 直接排放的一次颗粒物(PPM)和经由气态污染物转化生成的二次颗粒物(SPM)。
58 具体来说, PPM 的主要组分包括沙尘 (Dust)、一次有机气溶胶 (POA) 和元素
59 碳 (EC); SPM 则主要由二次无机气溶胶 (SIA, 硫酸盐+硝酸盐+铵盐) 和二次
60 有机气溶胶 (SOA) 组成 (Niu *et al.*,2022; Zhang *et al.*,2015)。随着 2013 年《大
61 气污染防治行动计划》和 2018 年《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的颁布和实
62 施, 我国环境空气质量逐步提高, PM_{2.5} 浓度明显降低 (耿冠楠等,2020; 王芃
63 等,2022; Zhai *et al.*,2019), 但不同的 PM_{2.5} 组分变化存在显著的时间和区域差异。

64 Zheng 等人 (2018) 指出, 我国 PM_{2.5} 前体物 SO₂、NO_x、BC 和 OC 在 2013-
65 2017 年期间分别减排 59%、21%、28%和 32%。基于不同前体物的减排, Cao 等
66 人 (2025) 通过 CMAQ 模型模拟中国不同地区代表性二次无机气溶胶 (SO₄²⁻和
67 NO₃⁻) 浓度, 结果表明, 2013 年后汾渭平原和四川盆地 SO₄²⁻显著下降, 而 NO₃⁻
68 未呈现明显下降趋势。Geng 等人 (2019) 采用 CMAQ 模拟 2013-2017 年中国东
69 部地区 PM_{2.5} 化学成分的变化, 结果表明, 2013-2017 年中国东部地区不同颗粒
70 物组分下降了 0.7~4.4 μg m⁻³, 代表性 PPM 和 SPM 分别下降了 16%和 20%。
71 Zheng 等人 (2023) 使用 CMAQ/2D-VBS 模型, 模拟 2005-2019 年的有机气溶
72 胶浓度, 结果表明, 2005-2019 年, 中国整体有机气溶胶浓度有所降低, 但二次
73 占比显著上升 (47.08%升至 67.19%)。由于前体物排放估算和参数化方案的不确
74 定性, 现有数值模型的 PM_{2.5} 组分变化研究存在较大的差异和局限性, 例如在一
75 些化学传输模型, 如 CMAQ (Kim *et al.*,2006; Zheng *et al.*,2015)、CAMx
76 (Fountoukis *et al.*,2011) 和 GEOS - Chem (Wang *et al.*,2013), 发现模式对 SPM
77 存在普遍的低估现象, 这可能导致模型在捕捉不同地区 PM_{2.5} 组分差异和时间变
78 化上的误差 (Lu *et al.*,2021; Lv *et al.*,2021;Li *et al.*,2023; Liu *et al.*,2022)。

79 基于观测手段的 PM_{2.5} 组分研究也受到广泛关注 (Lai *et al.*,2016; Wang *et*
80 *al.*,2016; Liu *et al.*,2025; Yu *et al.*,2022)。Zhao 等人 (2019) 采样并分析河北邯
81 郸 2013 和 2017 年 PM_{2.5} 及其组分的浓度变化, 结果表明, 2017 年相较于 2013
82 年, 邯郸 PPM 和 SPM 分别下降了 52.13%和 31.74%。Liu 等人 (2018) 通过对

83 中国 20 个城市站点和 12 个背景站点 2012-2013 年 PM_{2.5} 及其组分的观测建立
84 CARE-China 网络，对不同站点各组分的变化和特征进行分析。目前，已有多项
85 研究通过观测结合数值模拟建立 PM_{2.5} 化学成分监测网络并对 PM_{2.5} 不同组分进
86 行时间和空间变化趋势研究 (Zhang *et al.*,2012; Xin *et al.*,2015; Snider *et al.*,2016;
87 Dao *et al.*,2019)，但多聚焦于代表性站点或时段，已发布的针对长时间和不同区
88 域的 PM_{2.5} 组分变化的观测研究依旧不足。

89 本团队研发了基于观测数据的多元示踪模型 (Multi-Tracer Estimation
90 Algorithm, MTEA) (Zhang *et al.*,2022)，与传统组分观测和数值模式研究相比，
91 该方法无需依赖详细 PM_{2.5} 组分观测和化学反应参数化方案，可以较低的经济和
92 技术成本实现对观测 PM_{2.5} 的一次组分和二次组分的快速识别和区分。同时
93 MTEA 模型可与常规 PM_{2.5} 观测数据结合，进而获得站点级 PM_{2.5} 一次组分和二
94 次组分浓度数据。本研究利用 MTEA 模型，结合 2015-2023 年我国 367 个城市
95 的近 2000 个环境空气质量监测站数据，获得我国高时空分辨率和高覆盖范围的
96 PPM 和 SPM 数据库，并基于此数据库分析 PPM、SPM 以及 SPM 在 PM_{2.5} 中占
97 比的空间分布特征和年际变化趋势。

98

99 2 数据与方法

100 2.1 多元示踪剂模型 (MTEA)

101 为了有效区分 PM_{2.5} 中的一次和二次组分，研究团队开发了多元示踪剂模型
102 (Multi-Tracer Estimation Algorithm, MTEA) (Zhang *et al.*,2022)，模型选用燃烧
103 产物 CO 和粗模态颗粒物 PMC (PMC=PM₁₀-PM_{2.5})，通过排放数据量化两者对
104 PPM 相对贡献，组合建立示踪剂 X，如公式 (2-1) 所示

$$105 \quad X = a * CO + b * PMC \quad (2-1)$$

106 其中，a 和 b 分别表示 CO 和 PMC 对 PPM 的相对贡献，a 和 b 的值由方程 (2-
107 2) 计算。

$$108 \quad \frac{a}{b} = \frac{E_{OA} + E_{EC}}{E_{Dust}} = \frac{1.2 * E_{OC} + E_{EC}}{E_{PM_{2.5}} - (1.2 * E_{OC} + E_{EC} + E_{SO_4^{2-}} + E_{NO_3^-})} \quad (2-2)$$

109 其中, E_{OA} 、 E_{EC} 、 E_{Dust} 、 E_{OC} 、 $E_{PM_{2.5}}$ 、 $E_{SO_4^{2-}}$ 和 $E_{NO_3^-}$ 表示 OA、EC、沙尘、OC、
110 $PM_{2.5}$ 、 SO_4^{2-} 和 NO_3^- 的排放值。研究表明, 铵盐主要来自二次生成, 一次排放的
111 铵盐含量较低, 因此本研究选择忽略不计 (Pan et al.,2014)。根据文献建议, 我
112 们通过将 POA 排放量乘以 1.2 的经验系数来进一步估算 POA 排放量 (Seinfeld
113 and Pandis, 2006)。

114 通过不同时间和不同地区 POA、EC 和 Dust 排放的比值获取对应的 a 和 b,
115 进一步结合 CO 和 PMC 计算出示踪剂 X。进一步通过方程 (2-3) 计算 PPM 和
116 SPM, 其中 $PM_{2.5}$ 为观测浓度, X 由上述公式计算获取, SPM 的计算则只需确定
117 PPM/X 的目标比率。PPM/X 的值通过在 0-400 范围内以 1 (或者更小) 的步长进
118 行扫描, 分别计算每个 PPM/X 值对应的 SPM 浓度, 并以此获取 PPM 和 SPM 浓
119 度之间的拟合系数 (R^2), 取其相关性不显著情况下对应 SPM 浓度区间, 求均值
120 作为最终 SPM 浓度。

$$121 \quad SPM = PM_{2.5} - PPM = PM_{2.5} - \frac{PPM}{X} \times X \quad (2-3)$$

123 2.2 空气质量观测数据

124 本研究采用中国生态环境部建立的国家环境空气质量监测网 (国控站)
125 (<https://air.cnemc.cn:18007/> [2024-09-14]) 数据。该网络包含近 2000 个站点, 可
126 以获取小时 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 、 O_3 和 CO 浓度。本研究选取了 2015-2023
127 年间中国 32 个省级行政区共 367 个城市的 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 和 CO 浓度数据输入
128 MTEA 模型以获取 PPM 和 SPM 数据集, 并利用 O_3 观测数据辅助解释 PPM 和
129 SPM 质量浓度年际变化特征。研究选取的中国 367 个城市中心地理位置见图 1。

图 1 中国 367 城市中心及 8 个不同区域的地理位置

Fig.1 Geographical location of 367 urban centers and 8 different regions in China

2.3 排放清单数据

本研究采用清华大学开发的中国多尺度排放清单 (Multi-resolution Emission Inventory model for China, MEIC: <http://www.meicmodel.org> [2024-09-18]), 该清单分辨率为 $0.25^{\circ} \times 0.25^{\circ}$, 其中包含温室气体和我国 10 种主要大气污染物 (SO_2 、 NO_x 、 CO 、 NMVOC 、 NH_3 、 CO_2 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 PM_{10} 、 BC 和 OC) 的网格化数据, 并划分了工业、居民、交通、农业、电力五部门 (Li *et al.*, 2017a; 2017b; Zheng *et al.*, 2018)。本文采用 2015-2023 年 MEIC 1.4 清单的全部门逐月 OC 、 EC 和 $\text{PM}_{2.5}$ 的排放数据。其中, 2015-2020 年的数据通过 MEIC 网站公开获取, 2021-2023 年的排放数据结合观测数据进行外推获取。目前自下而上的排放清单通常具有 1-2 年的时间滞后性, 为了评估整体排放清单的不确定性对 MTEA 模型的影响, 研究团队通过在 $\pm 10\%$ 的范围内改变系数 a 和 b 进行比较试验。结果表明 2016 年我国主要的城市地区, $\text{PM}_{2.5}$ 二次比例变化受排放系数变化的幅度小于 $\pm 3\%$ 。表明排放清单对 MTEA 模型的结果有一定的影响, 但对最终结果的改变幅度不大。

147 3 结果与讨论

148 3.1 PPM 和 SPM 区域分布特征

149 通过 MTEA 模型得到的中国 367 个城市 2015 年、2023 年和 2015-2023 年平均
150 均 PPM 和 SPM 浓度如图 2 所示。2015 年全国 367 城市平均 PPM 和 SPM 浓度
151 分别为 $15.85 \mu\text{g m}^{-3}$ 和 $25.86 \mu\text{g m}^{-3}$ ；2023 年分别为 $10.28 \mu\text{g m}^{-3}$ 和 $15.42 \mu\text{g m}^{-3}$ ，
152 较 2015 年分别下降了 35.02%和 40.37%。从空间变化看，我国 PPM 和 SPM 空
153 间分布特征类似，整体均呈现东高西低，由高值中心向南北方向递减的分布情况，
154 高值主要集中分布于我国华北、华中地区以及位于华东地区北部的山东省、安徽
155 省和江苏省，这些地区对应较高的能耗需求和污染物排放特征；东北地区 and 长江
156 以南地区均呈现较低的浓度水平。

157

158 图 2 中国 2015 年、2023 年和 2015-2023 年平均 PPM 和 SPM 的空间分布

159 **Fig.2** Spatial distribution of PPM and SPM in China in 2015, 2023 and average from

160 2015 to 2023

161 图 3 进一步比较了不同年份 PPM 和 SPM 在 $\text{PM}_{2.5}$ 中占比的空间特征。PPM
162 占比 (PPM%) 和 SPM 占比 (SPM%) 在 2015 年至 2023 年间基本持平，其中
163 PPM%为 38.6%，SPM%为 61.4%。从空间分布上看，SPM%整体呈现南高北低的
164 分布特征，主要原因是相较于北方地区，南方的大气氧化条件更有利于气态污染
165 物的二次转化 (Lu *et al.*,2019b; Sun *et al.*,2014)。

166

167 图3 中国2015年、2023年和2015-2023年平均PPM%和SPM%空间分布

168 Fig.3 Spatial distribution of PPM% and SPM% in China in 2015, 2023 and average
 169 from 2015 to 2023

170 总体而言，我国SPM和PPM浓度及其在PM_{2.5}中的占比表现出明显的空间
 171 异质性。SPM和PPM浓度在华北、华中和华东北部地区显著高于其他地区，而
 172 SPM占比（SPM%）在南方地区较高，主要与南方较强的光化学氧化条件有关。
 173 这种空间分布特征反映了不同区域污染来源和形成机制的差异（Chen *et al.*,2022;
 174 Hao *et al.*,2020; Sun *et al.*,2016; Wang *et al.*,2020）。

175 PPM和SPM的浓度均存在显著的季节差异，其中夏季PPM和SPM的均值
 176 分别为8.63和13.2 μg m⁻³，显著低于其在冬季的均值（PPM:16.3 μg m⁻³,SPM:26.7
 177 μg m⁻³）。图4为PPM和SPM在不同季节的年际变化，整体而言，不同季节PPM
 178 和SPM的年际变化趋势相似，具体表现为在2015-2021年呈下降趋势，2021年
 179 后下降趋势减缓，其中春季和秋季2021-2023年呈上升趋势。

180

181 图4 全国2015年至2023年SPM、PPM和PM_{2.5}不同季节的年际变化

182 Fig.4 Interannual changes of SPM、PPM and PM_{2.5} of different seasons in China
 183 from 2015 to 2023

184 3.2 不同区域 PPM 和 SPM 年际变化趋势

185 根据 3.1 节空间分布特征的研究，将我国 367 个城市划分为以下 8 个区域：
186 东北、华北、西北、内蒙古、华东、华南、西南和华中，具体城市分布情况见图
187 1。

188

189 图 5 全国不同区域 2015 年至 2023 年 SPM、PPM 和 PM_{2.5} 年际变化

190 Fig.5 Interannual changes of SPM、PPM and PM_{2.5} in different regions of China
191 from 2015 to 2023

192 图 5 为基于中国不同区域的 2015-2023 年 SPM、PPM 和 PM_{2.5} 年际变化。总
193 体而言，8 个区域 PPM、SPM 和 PM_{2.5} 在 2015-2023 年都呈现下降趋势。但是，
194 年际变化趋势在 2021 年前后呈现显著差异，2015-2021 年各地区 PPM 和 SPM 浓
195 度均快速下降，2021-2023 年各地区下降趋势显著变缓，西北和华东地区甚至呈
196 现上升趋势。在 PPM 和 SPM 的共同作用下，PM_{2.5} 在 2021 年前后也呈现不同的
197 变化趋势，根据 PPM、SPM 和 PM_{2.5} 在 2015-2021 年和 2021-2023 年两个时段年
198 际变化趋势的差异进一步将 8 个区域的年际变化情况划分成以下四种情形。

199 西北和华东地区 PPM、SPM 和 PM_{2.5} 均从 2015-2021 年的下降趋势转变为
200 2021-2023 年的上升趋势，其 PM_{2.5} 浓度分别从 2015 年的 38.01 µg m⁻³ 和 42.63 µg
201 m⁻³ 下降至 2021 年的 25.45 µg m⁻³ 和 25.48 µg m⁻³。2021-2023 年以 +0.89 µg m⁻³ yr⁻¹
202 和 +0.25 µg m⁻³ yr⁻¹ 的速度上升至 27.24 µg m⁻³ 和 25.99 µg m⁻³，PPM 和 SPM 变

203 化趋势与 $PM_{2.5}$ 一致，其中 PPM 分别从以 $-0.56 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-1.14 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 的
204 下降速度转变为以 $+0.11 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $+0.07 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 的速度上升，SPM 则从 -1.66
205 $\mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-1.74 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 的下降变为 $+0.78 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $+0.18 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 的上
206 升。在 $PM_{2.5}$ 由浓度下降阶段向浓度上升阶段的转化中，两个区域 SPM 变化的
207 贡献（分别是 78.5%和 61.5%）均高于 PPM。

208 东北和华南地区的 PPM、SPM 和 $PM_{2.5}$ 浓度，与 2015-2021 年相比，在 2021
209 年后的下降速率明显放缓。 $PM_{2.5}$ 浓度由以 $-2.34 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-1.79 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 速
210 度下降转变为以 $-0.37 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-0.38 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 缓慢下降。华南地区的 SPM
211 浓度在 2021-2023 年呈现先降后升的趋势，变化情况趋于稳定（速度为 $-0.02 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ ）；
212 PPM 浓度则从下降逐步转为缓慢下降。东北地区也显示出相似的变化，
213 SPM 浓度在第二阶段呈缓慢下降趋势（速度为 $-0.33 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ ），而 PPM 浓度先
214 降后略有回升，2021-2023 年整体变化速度为 $-0.04 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 。

215 华北、华中和内蒙古地区 PPM 和 $PM_{2.5}$ 变化趋势一致：由下降变为以更缓
216 慢速度下降，而 SPM 则由下降转变为上升趋势。华北地区和华中地区 $PM_{2.5}$ 、
217 SPM 和 PPM 浓度在八个区域中均处于较高的水平，2015-2021 年 $PM_{2.5}$ 分别以
218 $-3.97 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-3.83 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 的速度大幅下降，其中 SPM 下降速度分别为
219 $-2.23 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ 和 $-2.46 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$ ，是 PPM 下降速度的 1.28 和 1.80 倍，即这两
220 个地区 SPM 的下降对 $PM_{2.5}$ 下降做出了较大的贡献。内蒙古地区整体变化趋势
221 与华北和华中地区一致，其 $PM_{2.5}$ 、SPM 和 PPM 浓度显著低于这两个地区。

222 西南地区 SPM 和 PPM 整体变化幅度较小，2021 年后 SPM 浓度的缓慢下降
223 ($-0.6 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$) 和 PPM 的上升 ($+0.23 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$) 共同导致了 $PM_{2.5}$ 的平稳
224 趋势 ($-0.01 \mu\text{g m}^{-3} \text{yr}^{-1}$)。

图 6 全国不同区域 2015 年-2023 年 SPM%和 PPM%年际变化

Fig.6 Interannual changes of SPM% and PPM% in different regions of China from 2015 to 2023

225 图 6 为 2015-2023 年我国 8 个区域 SPM 和 PPM 占 $PM_{2.5}$ 比值的年际变化。
 226 SPM%年际变化在不同区域间存在显著差异，同时 2021 年 SPM 占比变化趋势前
 227 后也有明显差异。其中西北、华中、华南和内蒙古地区的 SPM%虽然水平差异较
 228 大，但 9 年变化趋势较为一致，即 2021 年前以较快速率下降，随后又以较快速
 229 率上升。西北地区 SPM%从 2015 年的 67.75%下降至 2021 年的 63.57%，随后又
 230 以较快速率上升至 2023 年的 64.89%。内蒙古地区的 SPM%在 2015-2021 年以
 231 $-0.43\% \text{ yr}^{-1}$ 速率下降，2020 年达到最低（为 62.79%），随后上升至 2022 年以
 232 68.31% 的占比达到 9 年峰值。华南地区的 SPM%处较高水平（66.67%），年际变
 233 化以 2021 年为节点先降后升。华中地区 9 年 SPM%均小于 60%，2021 年前以
 234 $0.61\% \text{ yr}^{-1}$ 的速率下降，随后以 $0.58\% \cdot \text{yr}^{-1}$ 的较快速率上升。东北地区 SPM%相
 235 较其他区域处较低水平，9 年平均占比约为 57.77%，但其仍从 2015 年的 60.07%
 236 下降至 2021 年的 57.48%，随后以较快速率下降。

237 华北地区的 9 年平均 SPM%为 8 个区域最低（55.11%），总体趋势轻微上升，
 238 2015-2021 年占比缓慢下降（速率约为 $-0.16\% \text{ yr}^{-1}$ ），但 2021-2023 年快速上升。
 239 西南地区的 SPM%水平整体轻微下降，且处于全国最高水平，9 年平均占比约为
 240 68.66%，2015-2021 年 SPM 占比几乎不变（速率约为 $-0.09\% \cdot \text{yr}^{-1}$ ），2021-2023

241 年则以 $1.12\% \text{ yr}^{-1}$ 的速率急促下降。华东地区 SPM%水平在 2015-2023 年整体保
242 持平稳, 2021 年前变化速率约为 $0.06\% \text{ yr}^{-1}$, 2021 年后变化速率约为 $0.10\% \text{ yr}^{-1}$,
243 说明该地区的 SPM%水平 9 年间几乎不变。

244 2015-2023 年全国 SPM 浓度为 $18.55 \mu\text{g m}^{-3}$, PPM 为 $12.17 \mu\text{g m}^{-3}$, SPM%约
245 为 62%, 2015-2021 年整体均呈现下降趋势, 且下降趋势在 2021 年后均出现明
246 显转折。具体而言, 2021 年后 SPM 以 $+0.10 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 左右的速度缓慢上升、PPM
247 以 $-0.14 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 的速度缓慢下降, 与之对应的是 SPM%以 $+0.49\% \text{ yr}^{-1}$ 的速度迅
248 速上升。这一变化表明, $\text{PM}_{2.5}$ 中二次组分的污染贡献正在逐步增加, 而一次颗
249 粒物的治理效果相对显著 (徐洋等,2024; Jing *et al.*,2020)。为了分析 SPM%变化
250 的原因, 图 7 分别展示了 SO_2 、 NO_2 和 O_3 在 2015-2023 年的年际变化情况。其
251 中, SO_2 整体呈下降趋势, 2018 年后下降趋势逐渐放缓, SO_2 作为硫酸盐 (SO_4^{2-})
252 的重要前体物, 其下降趋势减缓可能导致硫酸盐浓度的下降速度同步减缓 (Chen
253 *et al.*,2019; Chu *et al.*,2020; Yang *et al.*,2015)。特别是在 SO_2 排放量较高的地区,
254 硫酸盐浓度可能趋于稳定甚至出现小幅回升。 NO_2 整体呈现波动下降趋势, 2022
255 年浓度降至 9 年内最低 ($21.39 \mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$), O_3 则保持持续上升趋势, 导致大气氧
256 化能力增强, 促进 SO_2 和 NO_x 的气相氧化反应和颗粒物表面的非均相化学反应
257 过程, 进一步促进 SO_4^{2-} 和 NO_3^- 生成, 这可以解释 SPM 浓度的上升及其在 $\text{PM}_{2.5}$
258 中占比的上升 (Cheng *et al.*,2016; Lu *et al.*,2019a; Sun *et al.*,2022)。

259

260

261 图 7 2015 年至 2023 年中国平均 SO_2 、 NO_2 和 O_3 年际变化

262 Fig.7 Interannual changes of SO_2 、 NO_2 and O_3 in China from 2015 to 2023

263

264 4 结论 (Conclusions)

265 本研究基于多元示踪剂模型 (MTEA) 实现对我国 2015-2023 年 367 个城市
266 一次和二次颗粒物的识别和区分, 依据其空间分布情况划分 8 个区域, 对这 8 个
267 区域的 SPM、PPM 以及 SPM% 的年际变化进行分析。结果表明:

268 (1) 2015-2023 年我国 PPM 和 SPM 浓度分别从 $15.85 \mu\text{g m}^{-3}$ 和 $25.86 \mu\text{g m}^{-3}$
269 3 下降至 $10.28 \mu\text{g m}^{-3}$ 和 $15.42 \mu\text{g m}^{-3}$, 9 年分别下降了 35.02% 和 40.37%。但 2021
270 年前后趋势有显著变化, 具体而言, 2015-2021 年 PPM 和 SPM 均持续下降 (速
271 度分别为 $-0.91 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 和 $-1.70 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), 但 2021 年后 PPM 下降趋势放缓
272 ($-0.14 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$), 而 SPM 甚至上升 ($+0.10 \mu\text{g m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$)、与之对应 SPM% 也
273 以 $+0.49 \% \text{ yr}^{-1}$ 的速度迅速上升。

274 (2) 空间上, 不同区域 PPM、SPM 和 SPM% 年际变化也存在显著差异。具
275 体而言, 华北、华中和内蒙古地区 PPM 和 SPM 在 2015-2021 年间显著下降, 但
276 2021 年后 PPM 下降变缓, 且 SPM 微弱上升, 与全国整体趋势一致。与之不同,
277 东北和华南地区 2021 年后 PPM 和 SPM 均持续下降, 西北和华东地区 2021 年后
278 PPM 和 SPM 均呈上升趋势, 而西南地区 2021 年后 SPM 下降变缓, PPM 持续上
279 升。

280 (3) 二次占比分析表明, 我国华南和西南地区 SPM% 更高, 可达
281 66.67%~68.66%。各区域 SPM% 的年际变化类似, 2015-2021 年间 SPM% 波动下
282 降, 由 61.74% 下降至 59.25%, 2021 年后由于二次颗粒物前体物减排速度放缓和
283 O_3 持续恶化导致的大气氧化能力增强, SPM% 转为上升, 速率可达 $0.58\% \sim 1.54\%$
284 yr^{-1} 。西南地区与绝大部分地区不同, 其 SPM% 在 2021 年后仍持续下降。

285

286 参考文献

- 287 Cao J Y, Zheng B Y, Chen J X, et al. 2025. Assessment of sulfate and nitrate variations
288 in China during 1990-2020: insights into source contributions and formation
289 pathways[J]. Journal of Hazardous Materials, 489:137600.
290 Chen T Z, Chu B W, Ge Y L, et al. 2019. Enhancement of aqueous sulfate formation
291 by the coexistence of NO_2/NH_3 under high ionic strengths in aerosol water[J].
292 Environmental Pollution, 252:236-244.

- 293 Chen Y, Hong Z Y, Chen J S, et al. 2022. Characteristics of secondary organic aerosols
294 tracers in PM_{2.5} in three central cities of the Yangtze river delta, China[J].
295 Chemosphere, 293:133637.
- 296 Cheng Y, Zheng G, Wei C, et al. 2016. Reactive nitrogen chemistry in aerosol water as
297 a source of sulfate during haze events in China[J]. Science Advances, 2(12):
298 e1601530.
- 299 Chu B, Ma Q, Liu J, et al. 2020. Air pollutant correlations in China: secondary air
300 pollutant responses to NO_x, and SO₂ control[J]. Environmental Science &
301 Technology Letters, 7(10): 695-700.
- 302 Dao X, Lin Y C, Cao F, et al. 2019. Introduction to the national aerosol chemical
303 composition monitoring network of china objectives, current status, and outlook[J].
304 Bulletin of the American Meteorological Society, 100(12): ES337-ES351.
- 305 Fountoukis C, Racherla P N, Denier van der Gon H A C, et al. 2011. Evaluation of a
306 three-dimensional chemical transport model (PMCAMx) in the European domain
307 during the EUCAARI May 2008 campaign[J]. Atmospheric Chemistry and
308 Physics, 11(20):10331-10347.
- 309 Geng G N, Xiao Q Y, Zheng Y X, et al. 2019. Impact of China's air pollution prevention
310 and control action plan on pm_{2.5} chemical composition over eastern china[J].
311 Science China Earth Sciences, 62(12):1872-1884.
- 312 耿冠楠, 肖清扬, 郑逸璇, 等. 2020. 实施《大气污染防治行动计划》对中国东部
313 地区 PM_{2.5} 化学成分的影响[J].中国科学:地球科学, 50(4):469-482.
- 314 Hao Y F, Meng X P, Yu X P, et al. 2020. Quantification of primary and secondary
315 sources to PM_{2.5} using an improved source regional apportionment method in an
316 industrial city, China[J]. Science of the Total Environment, 706:135715.
- 317 Jing Z Y, Liu P F, Wang T H, et al. 2020. Effects of meteorological factors and
318 anthropogenic precursors on PM_{2.5} concentrations in cities in China[J].
319 Sustainability, 12(9):3550.
- 320 Kim J Y, Song C H, Ghim Y S, et al. 2006. An investigation on NH₃ emissions and
321 particulate NH₄⁺-NO₃⁻ formation in East Asia[J]. Atmospheric Environment,
322 40(12):2139-2150.
- 323 Lai S, Zhao Y, Ding A, et al. 2016. Characterization of PM_{2.5} and the major chemical
324 components during a 1-year campaign in rural Guangzhou, Southern China[J].
325 Atmospheric Research, 167: 208-215.
- 326 Li M, Liu H, Geng G N, et al. 2017a. Anthropogenic emission inventories in China: A
327 review[J]. National Science Review, 4(6):834-866.
- 328 Li M, Zhang Q, Kurokawa J, et al. 2017b. MIX: a mosaic Asian anthropogenic emission
329 inventory under the international collaboration framework of the MICS-Asia and
330 HTAP[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 17(2):935-963.
- 331 Li N, Zhang H R, Zhu S H, et al. 2023. Secondary PM_{2.5} dominates aerosol pollution
332 in the Yangtze River Delta region: Environmental and health effects of the Clean
333 air Plan[J]. Environment International, 171:107725.
- 334 Liu Z, Gao W, Yu Y, et al. 2018. Characteristics of PM_{2.5} mass concentrations and
335 chemical species in urban and background areas of China: emerging results from
336 the CARE-China network [J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 18(12): 8849-

- 337 71.
- 338 Lu K, Fuchs H, Hofzumahaus A, et al. 2019a. Fast photochemistry in wintertime haze:
339 consequences for pollution mitigation strategies[J]. *Environmental Science &*
340 *Technology*, 53:10676-10684.
- 341 Lu K, Guo S, Tan Z, et al. 2019b. Exploring atmospheric free-radical chemistry in
342 China: the self-cleansing capacity and the formation of secondary air pollution[J].
343 *National Science Review*, 6:579-594.
- 344 Lu M M, Tang X, Feng Y C, et al. 2021. Nonlinear response of SIA to emission changes
345 and chemical processes over eastern and central China during a heavy haze
346 month[J]. *Science of the Total Environment*, 788:147747.
- 347 Lv L L, Wei P, Li J, et al. 2021. Application of machine learning algorithms to improve
348 numerical simulation prediction of PM_{2.5} and chemical components[J].
349 *Atmospheric Pollution Research*, 12(11):101211.
- 350 Niu Y W, Li X L, Qi B, et al. 2022. Variation in the concentrations of atmospheric
351 PM_{2.5} and its main chemical components in an eastern China city (Hangzhou)
352 since the release of the Air Pollution Prevention and Control Action Plan in
353 2013[J]. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 15(2):321-337.
- 354 Pan Y, Tian S, Liu D, et al. 2018. Source apportionment of aerosol ammonium in an
355 ammonia-rich atmosphere: An isotopic study of summer clean and hazy days in
356 urban Beijing. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 123, 5681–5689.
- 357 Seinfeld J H, Pandis S N. 2006. *Atmospheric chemistry and physics: from air pollution
358 to climate change*, Third edition [M]. New York: John Wiley.
- 359 Snider G, Weagle C L, Murdymootoo K K, et al. 2021. Variation in global chemical
360 composition of PM_{2.5}: emerging results from SPARTAN[J]. *Atmospheric
361 Chemistry and Physics*, 16:9629–9653.
- 362 Sun C, Zhao N, Zhuang Z, et al. 2014. Mechanisms and reaction pathways for
363 simultaneous oxidation of NO_x and SO₂ by ozone determined by in situ IR
364 measurements[J]. *The Journal of Hazardous Materials*, 274:376-383.
- 365 Sun J J, Xie X D, Qin M M, et al. 2022. Analysis of coordinated relationship between
366 PM_{2.5} and ozone and its affecting factors on different timescales (in Chinese) [J].
367 *Chinese Science Bulletin*, 67:2018-2028.
- 368 Sun Y L, Du W, Wang Q Q, et al. 2016. Primary and secondary aerosols in Beijing in
369 winter: sources, variations and processes[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*,
370 255:8309-8329.
- 371 Wang G Q, Wang M Y, Sun L T, et al. 2023. Differences in the chemical compositions
372 and formation mechanisms of PM_{2.5} between urban and rural areas in Xinxiang,
373 Central China around the Beijing Winter Olympics[J]. *Atmospheric Environment*,
374 312:119999
- 375 王芃, 朱盛强, 张梦媛, 等. 2022. 大气氧化性及其对二次污染物形成的贡献[J].
376 *科学通报*, 67(18):2069-2078.
- 377 Wang Q X, Zeng Q L, Tao J H, et al. 2019. Estimating PM_{2.5} concentrations based on
378 MODIS AOD and NAQPMS data over Beijing-Tianjin-Hebei[J]. *Sensors*,
379 19(5):1207.
- 380 Wang T Y, Huang X, Wang Z L, et al. 2020. Secondary aerosol formation and its

381 linkage with synoptic conditions during winter haze pollution over eastern
382 China[J]. *Science of the Total Environment*, 730:138888.

383 Wang Y, Zhang Q Q, He K, et al. 2013. Sulfate-nitrate-ammonium aerosols over China:
384 response to 2000-2015 emission changes of sulfur dioxide, nitrogen oxides, and
385 ammonia[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 5: 2635-2652.

386 Xin J Y, Wang Y S, Pan Y P, et al. 2015. The campaign on atmospheric aerosol research
387 network of China: CARE-China[J]. *Bulletin of the American Meteorological*
388 *Society*, 96(7):1137-1155.

389 徐洋, 汤克勤, 魏崇, 等. 2024. 2015-2020 年我国 PM_{2.5} 改善与气态前体物减排响
390 应分析[J]. *环境科学学报*, 44(06): 217-225.

391 Yang Y, Liu X, Qu Y, et al. 2015. Characteristics and formation mechanism of
392 continuous hazes in China: a case study during the autumn of 2014 in the North
393 China Plain[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15:8165-8178.

394 Yu Y H, Cheng P, Li Y J, et al. 2022. The association of chemical composition
395 particularly the heavy metals with the oxidative potential of ambient PM_{2.5} in a
396 megacity (Guangzhou) of southern China[J]. *Environmental Research*,
397 213:113489.

398 Zhai S, Jacob D J, Wang X, et al. 2019. Fine particulate matter (PM_{2.5}) trends in China,
399 2013–2018: Separating contributions from anthropogenic emissions and
400 meteorology[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 19(16):11031-11041.

401 Zhang H R, Li N, Tang K Q, et al. 2022. Estimation of secondary PM_{2.5} in China and
402 the United States using a multi-tracer approach[J]. *Atmospheric Chemistry and*
403 *Physics*, 22:5495-5514.

404 Zhang R, Wang G, Guo S, et al. 2015. Formation of urban fine particulate matter[J].
405 *Chemical Reviews*, 115(10):3803-3855.

406 Zhang X Y, Wang Y Q, Niu T, et al. 2012. Atmospheric aerosol compositions in China:
407 spatial/temporal variability, chemical signature, regional haze distribution and
408 comparisons with global aerosols[J]. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 12:779-
409 799.

410 Zhao L, Wang L T, Tan J H, et al. 2019. Changes of chemical composition and source
411 apportionment of PM_{2.5} during 2013-2017 in urban Handan, China[J].
412 *Atmospheric Environment*, 206:119-131.

413 Zheng B, Zhang Q, Zhang Y, et al. 2015. Heterogeneous chemistry: a mechanism
414 missing in current models to explain secondary inorganic aerosol formation during
415 the January 2013 haze episode in North China[J]. *Atmospheric Chemistry and*
416 *Physics*, 15(4):2031-2049.

417 Zheng B, Tong D, Li M, et al. 2018. Trends in China's anthropogenic emissions since
418 2010 as the consequence of clean air actions[J]. *Atmospheric Chemistry and*
419 *Physics*, 18(19):14095-14111.

420 Zheng H T, Chang X, Wang S X, et al. 2023. Sources of organic aerosol in China from
421 2005 to 2019: a modeling analysis[J]. *Environmental Science & Technology*, 57
422 (14):5957-5966.

423